

**AZIENDA ULSS8 BERICA**

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER  
L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI:  
N° 2 POSTI DI OPERATORE SOCIO SANITARIO  
CATEGORIA B LIVELLO ECONOMICO "BS"

**QUESTIONARIO 3**

**NON APRIRE**

l'involucro che racchiude il questionario prima  
che venga dato il segnale di inizio della prova

VERSIONE QUESTIONARIO



P00850



**INCOLLARE  
SUL MODULO  
RISPOSTE  
L'ETICHETTA  
POSTA A FIANCO**

*Toumari*

*Felice Ingegnere*

**001. Le precauzioni aggiuntive sono:**

- A) misure da adottare insieme alle precauzioni standard solo in caso di pandemia
- B) misure introdotte periodicamente per aggiornare le precauzioni standard
- C) misure integrative alle precauzioni standard in relazione alla via di trasmissione
- D) misure specifiche per il corretto smaltimento dei rifiuti speciali

**002. La RCP deve essere eseguita con il paziente in posizione:**

- A) qualsiasi purché non si perda tempo
- B) supina
- C) quella in cui si trova, se si sospetta un trauma
- D) posizione laterale di sicurezza

**003. In caso di temperatura corporea elevata, quali interventi assistenziali sono di competenza dell'OSS?**

- A) Interventi di tipo farmacologico
- B) Interventi rivolti ad agire sul quadro sintomatologico dell'ipertermia
- C) Interventi che favoriscono la perdita di calore corporeo
- D) Interventi rivolti ad agire sulle cause dell'ipertermia

**004. Il trasporto del materiale biologico deve avvenire:**

- A) nel rispetto delle procedure aziendali e nel più breve tempo possibile
- B) nel più breve tempo possibile
- C) in un contenitore di plastica, in breve tempo con i DPI
- D) non vi sono disposizioni specifiche quando l'operatore ha tempo

**005. In caso di ostruzione completa delle vie aeree la manovra di Heimlich:**

- A) deve essere praticata solo se la vittima è ancora cosciente
- B) richiede l'uso della cannula faringea
- C) deve essere praticata solo se la vittima è priva di coscienza
- D) deve essere praticata solo se la vittima è in arresto cardiaco

**006. Per spostare correttamente un peso è necessario:**

- A) mantenere i piedi ben distanziati, in modo da allargare la base d'appoggio e distribuire il peso sugli arti inferiori
- B) portare il peso su entrambe le braccia ed allontanare il peso dal corpo per evitare di farsi male
- C) portare il peso su un unico braccio, per poter avere l'altro disponibile
- D) mantenere i piedi vicini, per ruotarsi liberamente con il tronco

**007. In caso di spargimento di liquidi biologici la sequenza operativa corretta è la seguente:**

- A) rendere l'area inaccessibile al personale esterno, indossare i DPI, cospargere sulla zona un preparato disinfettante a base di cloro e lasciare agire, rimuovere il materiale sparso ed eliminare come rifiuto sanitario pericoloso a rischio infettivo, detergere, trattare la superficie con disinfettante
- B) cospargere sulla zona un preparato disinfettante a base di cloro e lasciare agire, rendere l'area inaccessibile al personale esterno, rimuovere il materiale sparso e i guanti ed eliminare come rifiuto sanitario pericoloso a rischio infettivo, indossare i DPI, trattare la superficie con disinfettante e lavare con acqua ed asciugare
- C) rendere l'area inaccessibile al personale esterno, cospargere sulla zona un preparato disinfettante a base di Sali di ammonio e lasciare agire, detergere, rimuovere il materiale sparso ed eliminare come rifiuto sanitario pericoloso a rischio infettivo, trattare la superficie con disinfettante
- D) cospargere sulla zona un preparato disinfettante a base di cloro e lasciare agire, indossare i DPI, rimuovere il materiale sparso e i guanti ed eliminare come rifiuto sanitario pericoloso a rischio infettivo, trattare la superficie con disinfettante e lavare con acqua ed asciugare, rendere l'area inaccessibile al personale esterno

**008. Un corretto utilizzo dei guanti:**

- A) protegge solo le mani dalla disidratazione e dall'insorgenza di allergie conseguenti all'uso insistente di agenti chimici nell'operatività
- B) protegge i pazienti dalle infezioni nosocomiali e riduce l'insorgenza di reazioni cutanee allergiche negli operatori
- C) protegge i pazienti dalle infezioni nosocomiali ed elimina la necessità di lavare le mani
- D) può evitare o ridurre il rischio di contrarre e /o trasmettere malattie infettive e protegge dal contatto con agenti chimici, fisici e biologici

**009. Come intervenire in caso di atteggiamenti aggressivi di un paziente anziano:**

- A) tenere un atteggiamento calmo e non nervoso, bloccando fisicamente la persona
- B) contenere l'aggressività con atteggiamenti scherzosi e ironici
- C) usare un tono autoritario e una comunicazione decisa così da intimorire il paziente
- D) tenere un atteggiamento calmo e non nervoso, senza bloccare fisicamente la persona

**010. Quale tra le seguenti indicazioni, relativa alla conservazione dei disinfettanti, non è corretta:**

- A) non appoggiare sull'apertura della confezione, garze o cotone
- B) conservare i disinfettanti aperti in frigorifero
- C) conservare i disinfettanti nella confezione originale e ben chiuse
- D) rispettare le temperature considerate idonee alla loro conservazione

**011. Per raccogliere la prenotazione del pasto per un paziente con una dieta a basso residuo di scorie, quali alimenti fai evitare:**

- A) latte e yogurt
- B) contorni a base di verdure
- C) oli e grassi in genere
- D) un secondo a base di carne

**012. Uno dei principi della comunicazione afferma che: "Non si può non comunicare", cosa significa:**

- A) Ogni comunicatore sostiene solo il proprio punto di vista
- B) Qualsiasi nostro atteggiamento comunica qualcosa agli altri
- C) Bisogna sempre rispondere alle domande che ci vengono poste
- D) Nessuna delle altre alternative proposte

**013. Quando si alimenta la persona disfagica come deve essere posizionata?**

- A) quasi distesa sul letto
- B) a 90° con dorso eretto e testa leggermente in avanti
- C) a 45° sul piano del letto con il capo iperesteso all'indietro
- D) come la persona preferisce

**014. Un paziente emette radiazioni ionizzanti strumentalmente rilevabili quando ha effettuato:**

- A) Un esame TAC
- B) Un'ecografia
- C) Un RMN
- D) Un esame scintigrafico

**015. Come si deve comportare un OSS di fronte a un paziente con dispnea?**

- A) gli somministra ossigenoterapia
- B) rileva la frequenza respiratoria e avverte il medico
- C) lo posiziona seduto o semiseduto e avverte subito l'infermiere
- D) non deve fare nulla e avverte l'infermiere

**016. Durante un giro di controllo, un OSS si accorge che un paziente presenta ematuria. Come dovrà comportarsi?**

- A) controllare il decorso del catetere ed avvisare l'infermiere
- B) avvisare l'infermiere e nel frattempo clampare il catetere
- C) eseguire un prelievo delle urine e avvisare l'infermiere
- D) cambiare la sacca delle urine ed avvisare l'infermiere

**017. Nella deambulazione di una persona con esiti di emiparesi per la discesa delle scale con ausilio di un bastone, l'operatore dovrà posizionarsi:**

- A) Dal lato sano
- B) Dal lato plegico
- C) Dietro alla persona leggermente in posizione laterale
- D) Davanti alla persona

**018. Le precauzioni standard si applicano:**

- A) solo ai pazienti ricoverati nelle Terapie Intensive
- B) a tutti i pazienti indipendentemente dal fatto che ci sia diagnosi o sospetto di infezione
- C) solo ai pazienti con infezione conclamata
- D) solo ai pazienti non conosciuti

**019. Le tipologie di superfici per i pazienti a rischio di lesioni da decubito sono:**

- A) materassi in schiuma e a molle, sovrasmaterasso a pressione continua, materassi a pressione alternata a cessione d'aria
- B) materassi a molle e acqua statica, sovrasmaterasso a pressione continua, materassi a pressione alternata a cessione d'aria
- C) materassi in schiuma e aria statica, sovrasmaterasso a pressione alternata, materassi a pressione alternata a cessione d'aria
- D) materassi in schiuma sintetica, sovrasmaterasso in vello sintetico, materassi a pressione alternata a cessione d'acqua

**020. Dovendo comunicare con un anziano molto sordo è utile:**

- A) alzare molto la voce per essere sicuri di farsi sentire
- B) usare canali sensoriali alternativi
- C) ridurre al minimo le occasioni di comunicazione per evitargli inutili frustrazioni
- D) tutte le alternative proposte

**021. La procedura corretta per il rifacimento del letto occupato è:**

- A) arrotolare la biancheria sotto la schiena del paziente, stendere la biancheria pulita nella parte di materasso rimasta libera
- B) aiutare il paziente ad assumere la posizione laterale, arrotolare il lenzuolo di sotto fino a portarlo a contatto con il dorso dell'allettato, distendere il lenzuolo pulito rimboccandolo e facendo gli angoli dal lato esterno
- C) trasferire il paziente in una barella, rifare il letto, riposizionare il paziente
- D) lasciare il paziente in posizione supina e procedere al rifacimento del letto dai piedi alla testa

**022. Iniziata la somministrazione di un pasto il paziente inizia a tossire e ad avere una voce modificata, cosa deve fare l'OSS**

- A) non dare alla persona cibi solidi e continuare con la somministrazione di cibi liquidi
- B) sospendere l'alimentazione del paziente ed avvisare l'infermiere
- C) rallentare la velocità del pasto e ridurre il volume dei bocconi
- D) non dare alla persona cibi liquidi e continuare con la somministrazione di cibi solidi

**023. I farmaci scaduti o inutilizzabili di qualsiasi tipo e gli stupefacenti sono compresi:**

- A) nei rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione
- B) nei rifiuti sanitari assimilabili ai rifiuti urbani
- C) nei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo
- D) nei rifiuti sanitari non pericolosi

**024. L'esame dell'espettorato va eseguito:**

- A) in un contenitore pulito
- B) con manovre asettiche in un contenitore sterile
- C) con manovre asettiche in un contenitore pulito al mattino a digiuno
- D) in un contenitore sterile al mattino dopo colazione

**025. Nell'assistenza al paziente senza deficit cognitivi con dolore l'O.S.S. deve:**

- A) chiedere ai familiari e/o caregiver
- B) far valutare al paziente il suo dolore ma basarsi soprattutto sulla propria esperienza lavorativa
- C) credere a quanto riferito dal paziente
- D) interpretare il livello del dolore in base all'espressione del volto

**026. La mobilitazione di una persona a rischio di sviluppare ulcere da pressione è indicata almeno ogni:**

- A) 4 ore
- B) 8 ore
- C) 5 ore
- D) 2 ore

**027. In caso di biancheria infetta il confezionamento avviene:**

- A) insieme a tutta la biancheria piana
- B) separatamente attraverso un sacco in polietilene
- C) separatamente attraverso un sacco interno idrosolubile e un sacco esterno in polietilene
- D) nessuna delle altre alternative proposte

**028. In caso di emiplegia o in presenza di apparecchio gessato o infusione continua, qual è la tecnica da adottare nella svestizione della persona?**

- A) sfilare prima la manica dall'arto impedito e poi da quello sano
- B) sfilare la manica indifferentemente da un arto o dall'altro
- C) sfilare prima la manica dell'arto sano e poi da quello impedito
- D) sfilare contemporaneamente le due maniche

**029. Per preparare 1 litro di soluzione alla concentrazione del 20%, quanta acqua e quanto disinfettante sono necessari**

- A) 900 ml di acqua e 100 ml di disinfettante
- B) 800 ml di acqua e 200 ml di disinfettante
- C) 955 ml di acqua e 5 ml di disinfettante
- D) 950 ml di acqua e 50 ml di disinfettante

**030. Il confezionamento del materiale da sterilizzare con carta medical grade mantiene la sterilità, se correttamente conservato per:**

- A) 120 giorni**
- B) 30 giorni**
- C) 90 giorni**
- D) 60 giorni**