

- 1) Le infezioni ospedaliere sono sostenute prevalentemente da:
- A) Virus
 - B) Stafilococchi
 - C) Microrganismi gram negativi
 - D) Microrganismi gram positivi
- 2) L'esecuzione dell'intramuscolare con la tecnica Z comporta:
- A) La creazione di un percorso lineare che non impedisce l'alterato assorbimento del farmaco
 - B) La creazione di un percorso non lineare che impedisce il rischio di infezioni
 - C) La creazione di un percorso lineare che impedisce al liquido di risalire verso il tessuto sottocutaneo
 - D) La creazione di un percorso non lineare che impedisce al liquido di risalire verso il tessuto sottocutaneo
- 3) La piuria è:
- A) Presenza di bruciore alla minzione
 - B) Diuresi notturna
 - C) Presenza di sangue nelle urine
 - D) Presenza di pus nelle urine con urine torbide e maleodoranti
- 4) Se, durante una trasfusione di globuli rossi, il paziente manifesta brividi, cefalea, dolori, sensazione di calore, è necessario immediatamente:
- A) Diminuire la velocità di infusione e chiamare il medico
 - B) Aumentare la velocità di infusione e chiamare il medico
 - C) Diminuire la velocità di infusione e avvisare il servizio di emoteca
 - D) Sospendere la trasfusione, tenere la vena pervia con soluzione fisiologica e chiamare il medico
- 5) I rami dell'aorta toracica si distinguono in:
- A) Viscerali e renali
 - B) Parietali e viscerali
 - C) Parietali e brachiali
 - D) Brachiali e iliaca interna
- 6) Nelle fasi precoci di un'occlusione intestinale meccanica del colon il quadro clinico è caratterizzato da:
- A) Peristalsi assente
 - B) Difesa addominale diffusa
 - C) Dolori addominali di tipo crampiforme
 - D) Vomito fecaloide
- 7) Febbre remittente è:
- A) Rialzo termico durante il periodo dell'acme, subisce oscillazioni giornaliere superiori a 4°C senza che si raggiunga la defervescenza
 - B) Rialzo termico durante il periodo dell'acme, subisce oscillazioni giornaliere superiori a 1°C senza che si raggiunga la defervescenza
 - C) Rialzo termico durante il periodo dell'acme, subisce oscillazioni giornaliere superiori a 1°C raggiungendo la defervescenza
 - D) Rialzo termico durante il periodo dell'acme, subisce oscillazioni giornaliere superiori a 3°C senza che si raggiunga la defervescenza
- 8) Indicare quale tra le seguenti NON è un'infezione virale persistente
- A) Epatite B
 - B) Herpes simplex
 - C) Morbillo
 - D) Influenza
- 9) La cosiddetta "regola delle 7 G" prevede il controllo di:
- A) Giusta prescrizione, giusto farmaco, giusta dose, giusta persona, giusto orario, giusto lato, giusta registrazione
 - B) Giusta prescrizione, giusto farmaco, giusta dose, giusto posto letto, giusto orario, giusta via di somministrazione, giusta registrazione
 - C) Giusta prescrizione, giusto farmaco, giusta dose, giusta persona, giusto orario, giusta via di somministrazione, giusta registrazione
 - D) Giusta prescrizione, giusto farmaco, giusta dose, giusta persona, giusto orario, giusta via di somministrazione
- 10) Tra i seguenti NON sono considerati veicoli di infezioni:
- A) Le zanzare
 - B) I materiali di medicazione contaminati
 - C) Gli alimenti contaminati
 - D) Le trasfusioni
- 11) L'insufficienza aortica è causata dal rigurgito di sangue che va:
- A) Dal ventricolo sinistro all'atrio sinistro
 - B) Dall'aorta ascendente al ventricolo sinistro
 - C) Dall'atrio sinistro all'aorta ascendente
 - D) Dall'atrio sinistro al ventricolo sinistro
- 12) La disuria è una minzione:
- A) Frequente, di poche gocce di urina
 - B) Dolorosa con percezione di bruciore
 - C) Con presenza di sangue nelle urine
 - D) Notturna
- 13) La dissecazione dell'aorta è una lesione:
- A) Della tunica intima o una degenerazione della tunica media
 - B) Della tunica intima o della iliaca interna
 - C) Della parete addominale o una degenerazione della tunica media
 - D) Della cartilagine di Santorini o una degenerazione della tunica media
- 14) La corretta esecuzione dell'esame per emocoltura prevede:
- A) Un solo prelievo
 - B) Il prelievo a digiuno
 - C) Prelievi in concomitanza con l'acme febbrile
 - D) Più prelievi a distanza di 8 ore ciascuno
- 15) In caso di peritonite, il liquido peritoneale appare:
- A) Giallo paglierino
 - B) Trasparente
 - C) Torbido
 - D) Ematico

16) Secondo il comma 4 del DM 739 4/9/94 l'infermiere:

- A) Garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico/terapeutiche
- B) Contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca
- C) Partecipa all'identificazione dei bisogni della persona e della collettività
- D) Identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi

17) Con la PVC si misura la:

- A) Pressione esistente all'interno dell'atrio destro
- B) Pressione delle vie aeree
- C) Portata cardiaca
- D) Pressione esistente all'interno dell'atrio sinistro

18) I cateteri vescicali temporanei sono:

- A) Foley, Pezzer, Couvelaire
- B) Mercier, Foley, Pezzer
- C) Nelaton, Thiemann, Mercier
- D) Foley, Thiemann, Mercier

19) Nella sperimentazione clinica, il gruppo di controllo è il gruppo:

- A) Di pazienti che costituisce l'intero campione di riferimento
- B) Incaricato dal comitato etico di supervisionare la ricerca
- C) Di pazienti che non è stato incluso nel campione
- D) Di pazienti che non riceve il trattamento oggetto di sperimentazione

20) Quando si somministra albumina per via endovenosa l'infermiere deve essere consapevole che l'acqua corporea passa dal:

- A) Spazio interstiziale al circolo
- B) Comparto intravascolare verso il comparto interstiziale
- C) Comparto extracellulare verso il comparto intracellulare
- D) Comparto interstiziale verso il comparto extracellulare

21) Nel paziente con ferita chirurgica addominale la tosse efficace deve essere:

- A) Evitata in tutta la prima fase post-operatoria
- B) Evitata in tutta la prima fase pre-operatoria.
- C) Incoraggiata insegnando a sostenere la ferita lateralmente
- D) Incoraggiata indicando i momenti migliori della giornata

22) I bisogni fondamentali dell'uomo identificati da V. Henderson nella sua teoria sono:

- A) 6
- B) 14
- C) 12
- D) 15

23) Il trasporto di un paziente con trauma della colonna vertebrale va sempre eseguito:

- A) Dopo immobilizzazione con supporto spinale posteriore e con testa e collo in posizione neutra
- B) In posizione prona con testa e collo immobilizzati
- C) In posizione prona con testa e collo girati lateralmente
- D) In posizione supina con testa e collo iperestesi

24) La Legge 251/2000 è una legge che:

- A) Riforma il modello aziendale del sistema sanitario nazionale e istituisce la dirigenza infermieristica
- B) Istituisce i corsi di formazione continua e istituisce la dirigenza infermieristica
- C) Istituisce i corsi di laurea per infermieri e istituisce la dirigenza infermieristica
- D) Attribuisce agli infermieri la diretta responsabilità della gestione dei processi assistenziali e istituisce la dirigenza infermieristica

25) Sono stati prescritti 50 mg di lidocaina in bolo, in reparto è disponibile una confezione di lidocaina alla concentrazione di 20 mg/mL. Quanti mL è necessario somministrare?

- A) 5,5 mL
- B) 2,5 mL
- C) 50 mL
- D) 25 mL

26) Indicare quale di queste misure NON rientrano tra quelle da adottare per la prevenzione del rischio biologico:

- A) Immunizzazione attiva
- B) Norme igieniche e comportamentali
- C) Tecniche ed organizzative
- D) Selezione del personale

27) Indicare la teorica dell'assistenza infermieristica che parla del concetto di "self care":

- A) Virginia Henderson
- B) Emma Brombeck
- C) Suor Callista Roy
- D) Dorothea Orem

28) Quali sono le caratteristiche del respiro secondo Cheyne-Stokes?

- A) Caratterizzato da periodi alternati di ipo e iperventilazione; ad un periodo di apnea della durata di 5-30 secondi segue una fase durante la quale il volume corrente aumenta progressivamente fino ad un picco e successivamente decresce fino alla fase apnoica
- B) Iperpnea caratterizzata da respiri molto profondi, rapidi, regolari con abolizione della pausa espiratoria senza sforzo apparente
- C) Caratterizzato da una frequenza respiratoria inferiore a 10 atti/min
- D) Rapide e irregolari inspirazioni seguite da una lunga pausa espiratoria

29) Se NON ci sono controindicazioni, la sede più indicata per effettuare un'iniezione intramuscolare è:

- A) Quadricipite
- B) Gluteo ventrale
- C) Il dorsogluteo
- D) Il ventrolaterale

30) La falda di aria o liquidi sottodiaframmatica si diagnostica di norma con:

- A) RX tubo digerente
- B) Gastroscopia
- C) Ecografia epatica
- D) RX diretta addome

Leo Antonino
Ancini Michel

CLAUSI ANTONELLA
PROVA ESTRATTA 5/10/2016