

1) In caso di peritonite acuta generalizzata NON si osserva:

- A) L'iperperistaltismo
- B) Debolezza, pallore, diaforesi, cute fredda
- C) Muscolatura della parete addominale tesa
- D) Il dolore addominale profuso

2) La diaforesi è:

- A) Una profusa sudorazione
- B) Una stimolazione elettrica della cellula muscolare
- C) L'applicazione della borsa del ghiaccio
- D) Una sudorazione normale

3) Cosa valuta la scala di Barthel?

- A) Le funzioni che la persona assolve e il grado di autonomia nel loro svolgimento
- B) Gli ausili necessari alla persona
- C) La capacità di svolgere attività complesse
- D) Il supporto necessario alla persona

4) La documentazione infermieristica è definita come:

- A) Lo strumento utilizzato dall'infermiere per registrare il rapporto e la consegna di quanto è avvenuto nelle 12 ore
- B) L'insieme dei documenti che dimostrano il lavoro svolto dall'infermiere durante il turno lavorativo notturno
- C) Lo strumento cartaceo o informatizzato di organizzazione e di integrazione, sul quale l'infermiere registra i dati necessari per programmare, pianificare, attuare e valutare gli interventi assistenziali
- D) Lo strumento necessario per elaborare linee guida, procedure, protocolli, basati sull'evidenza scientifica e necessaria per organizzare i piani di lavoro

5) Secondo le Linee Guida OMS è necessario procedere al lavaggio delle mani:

- A) Prima del contatto con il paziente; prima di una manovra asettica; dopo esposizione a rischio ad un liquido corporeo; dopo il contatto con il paziente; dopo il contatto con l'ambiente circostante il paziente
- B) Prima del contatto con il paziente; prima di una manovra asettica; dopo esposizione a rischio ad un liquido corporeo; dopo il contatto con il paziente
- C) Prima del contatto con il paziente; prima di una manovra asettica; dopo il contatto con il paziente; dopo il contatto con l'ambiente circostante il paziente
- D) Prima di una manovra asettica; dopo esposizione a rischio ad un liquido corporeo; dopo il contatto con il paziente; dopo il contatto con l'ambiente circostante il paziente

6) In quali tipi di coma il paziente presenta alito acetoneo:

- A) Ipoglicemico
- B) Da edema cerebrale
- C) Iperglicemico
- D) Uremico

7) Quali scale sono utilizzate per la rilevazione del dolore:

- A) VAS, NRS, espressioni facciali
- B) Barthel, NES, espressioni facciali
- C) VAS, Braden, espressioni facciali
- D) VAS, NRS, Retos

8) Le Pleure sono:

- A) Membrane sierose, spesse che rivestono i polmoni e la superficie interna della cavità toracica
- B) Membrane sierose, sottili che rivestono i polmoni e la superficie interna della cavità addominale
- C) Membrane sierose, sottili e trasparenti che rivestono i polmoni e la superficie interna della cavità toracica
- D) Membrane sierose e spesse

9) Un essudato si differenzia da un trasudato per:

- A) Quantità di proteine
- B) Velocità di formazione
- C) Quantità di sangue
- D) Sito di accumulo

10) Quali sono i principali metodi di organizzazione del lavoro e di erogazione dell'assistenza:

- A) Nursing funzionale, piccole equipe o team nursing, self care, nursing modulare o per settori, gestione del caso o case management.
- B) Nursing funzionale, piccole equipe o team nursing, nursing primario o primary nursing, nursing modulare o per settori, gestione del caso o case management.
- C) Nursing funzionale, piccole equipe o team nursing, nursing primario o primary nursing, nursing modulare o per settori, minimum data set.
- D) Modello fiat, piccole equipe o team nursing, nursing primario o primary nursing, nursing modulare o per settori, gestione del caso o case management.

11) La prevenzione primaria consiste:

- A) Nell'anamnesi familiare
- B) Nella diagnosi precoce di una malattia
- C) Nel potenziamento dei fattori utili alla salute e nella rimozione dei fattori di rischio
- D) Nell'applicazione di un test di screening

12) È necessario somministrare 500 mg di carbocisteina sciroppo per via orale due volte al giorno. In reparto è presente una confezione di sciroppo da 50 mg/mL di principio attivo. Quanti mL di sciroppo devono essere somministrati ogni 12 ore?

- A) 15 mL
- B) 1,5 mL
- C) 5 mL
- D) 10 mL

13) Nell'ipertensione endocranica l'infermiere valuta:

- A) Inappetenza, vertigini e depressione
- B) Andatura atassica, rigor nucale
- C) Bruxismo, scialorrea e aggressività
- D) Cambiamenti del livello di coscienza, dei segni vitali e pupillari

14) Nel linguaggio del management la parola "outcome" significa:

- A) Obiettivo
- B) Pianificazione
- C) Fine
- D) Risultato

15) Per sterilizzazione si intende:

- A) La completa distruzione solo delle spore
- B) L'eliminazione di organismi patogeni e non, in forma vegetativa e sporigena
- C) L'eliminazione di organismi patogeni ma non delle spore
- D) La completa distruzione solo di organismi patogeni

16) La manovra di Heimlich si esegue per:

- A) Ridurre la lussazione scapolo-omerale
- B) Rimuovere corpi estranei dalle prime vie aeree
- C) Valutare la presenza di patologie acute a carico del rene
- D) Valutare i riflessi piramidali ed extra piramidali

17) Il catetere di Swan-Ganz raggiunge:

- A) La vena cava inferiore
- B) Il ventricolo sx
- C) L'atrio sx
- D) L'arteria polmonare

18) Uno dei seguenti strumenti NON deve essere preparato per l'intubazione endotracheale

- A) Pinza ad anelli
- B) Mandrino
- C) Tubo endotracheale
- D) Laringoscopia

19) Il case management viene anche denominato:

- A) Primary nursing di primo livello
- B) Nursing modulare
- C) Primary nursing di secondo livello
- D) Primary nursing di terzo livello

20) In caso di pneumotorace, il catetere inserito in cavità pleurica deve:

- A) Restare clampato in prima giornata
- B) Essere collegato ad un sacchetto sterile a caduta
- C) Essere lasciato aperto ma posto sotto medicazione occlusiva
- D) Essere collegato ad un sistema di drenaggio ad acqua

21) Nel paziente in ventilazione meccanica assistita, gli effetti benefici dati dall'applicazione di una PEEP possono essere:

- A) Riduzione del lavoro respiratorio
- B) Aumento dello spazio morto
- C) Riapertura di aree di parenchima polmonare prima chiuse
- D) Riduzione della gittata cardiaca

22) L'infermiere dipendente del SSN è un:

- A) Pubblico ufficiale
- B) Incaricato di pubblico servizio
- C) Esercente un incarico di pubblica necessità
- D) Esercente un servizio di pubblica utilità

23) Febbre intermittente è:

- A) Periodi di apiressia prolungati
- B) Periodi di ipertermia senza che si raggiunga la defervescenza
- C) Periodi di ipertermia continui
- D) Periodi di ipertermia si alternano con periodi di apiressia

24) Il respiro Kussmaul è tipico nelle seguenti condizioni cliniche:

- A) Insufficienza cardiaca
- B) Lesione dei centri respiratori
- C) Acidosi metabolica
- D) Traumi della trachea

25) Nella raccolta dati per valutare le caratteristiche oggettive del dolore occorre considerare:

- A) Tempo e modalità di inizio del sintomo, localizzazione, irradiazione
- B) Tempo e modalità di inizio del sintomo, valutazione nrs, irradiazione
- C) Tempo e modalità di inizio del sintomo, irradiazione
- D) Tempo e modalità di inizio del sintomo, valutazione vas, irradiazione

26) Fattori da considerare quando si sceglie un sito per la venipuntura:

- A) Condizioni della vena; tipo di liquidi o farmaci da infondere; durata della terapia, età e taglia del paziente, uso della mano destra o sinistra da parte del paziente, anamnesi medica del paziente e attuale stato di salute, abilità della persona che esegue la venipuntura
- B) Condizioni della vena; tipo di liquidi o farmaci da infondere; durata della terapia, età e taglia del paziente, anamnesi medica del paziente e attuale stato di salute, abilità della persona che esegue la venipuntura
- C) Condizioni della vena; tipo di liquidi o farmaci da infondere; durata della terapia, età e taglia del paziente, uso della mano destra o sinistra da parte del paziente, abilità della persona che esegue la venipuntura
- D) Condizioni della vena; durata della terapia, età e taglia del paziente, uso della mano destra o sinistra da parte del paziente, anamnesi medica del paziente e attuale stato di salute, abilità della persona che esegue la venipuntura

27) Le immunoglobuline che compaiono per prime in seguito ad una infezione batterica o virale sono:

- A) IgG
- B) IgE
- C) IgM
- D) IgA

28) Il trial randomizzato controllato è un metodo:

- A) Descrittivo
- B) Sperimentale
- C) Di comunità
- D) Analitico

29) L'antisepsi prevede:

- A) L'inibizione o distruzione di batteri su tessuti viventi
- B) La disinfezione di oggetti o superfici
- C) La sterilizzazione dello strumentario chirurgico
- D) La sterilizzazione di tessuti viventi

30) Quali sono le principali complicanze precoci nell'inserzione dei CVC:

- A) Pneumotorace, lesioni dell'arteria succlavia, emotorace
- B) Infezioni locali, trombosi venosa, stravaso
- C) Occlusione del cvc, trombosi venosa, stravaso
- D) Infezioni locali, trombosi venosa, migrazione del catetere

Marta Pisci *Stefano*

Antonello
PROVA NON ESTRATTA 05/10/2016