

**PROVA PRATICA N. 2: CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI
N. 2 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE INFERMIERE – CAT. D (76/2019/CON)**

1. **Quale sequenza è corretta nella preparazione di un paziente al quale dovrà essere introdotto un catetere vescicale?**
 - A. Posizionare il paziente
 - B. Lavaggio delle mani ed osservare le procedure per la prevenzione delle infezioni
 - C. Verificare identità del paziente
 - D. Presentarsi e spiegare la procedura
 - E. Provvedere alla privacy del paziente
 - a. D-B-E-A-C
 - b. C-A-E-D-B
 - c. B-A-E-C-D
 - d. C-D-B-E-A
2. **Quale sequenza è corretta nella somministrazione dei farmaci per via orale:**
 - A. Lavarsi le mani ed osservare le procedure per il controllo delle infezioni
 - B. Rimanere con il paziente fino a che tutto il farmaco non è stato ingerito.
 - C. Documentare la somministrazione sulla cartella clinico-infermieristica del paziente
 - D. Se il paziente non è in grado di reggere il contenitore con il farmaco, porgli il contenitore vicino alle labbra ed introdurre il farmaco in bocca.
 - E. Aiutare il paziente a mettersi in posizione seduta se necessario
 - a. A-E-B-C-D
 - b. A-E-D-B-C
 - c. D-B-A-C-E
 - d. B-D-A-C-E
3. **Il glucagone iniettabile deve essere somministrato nei pazienti con:**
 - a. Ipoglicemia grave, stato di incoscienza
 - b. Iperglicemia superiore a 200mg/dl, in stato di incoscienza
 - c. Iperglicemia superiore a 300 mg/dl, indipendentemente dallo stato di coscienza
 - d. Diabete tipo 1, con glicemia inferiore a 80mg/dl
4. **Ad una donna gravida occorre spiegare che il prelievo dei villi coriali va eseguito nella:**
 - a. I-II settimana di gravidanza
 - b. III-V settimana di gravidanza
 - c. VII-IX settimana di gravidanza
 - d. X-XI settimana di gravidanza
5. **In quale caso ti aspetti una ridotta eliminazione urinaria (nel volume)?**
 - a. Un paziente con ictus
 - b. Una donna in gravidanza
 - c. Un paziente anziano, disidratato
 - d. Tutte le precedenti
6. **Secondo le linee di indirizzo nazionali sul triage intraospedaliero emanate nel 2019, il sistema di codifica su cinque codici numerici di priorità persegue:**
 - a. Rapidità del trattamento
 - b. Tempestività e appropriatezza del trattamento
 - c. Presa in carico olistica del paziente
 - d. Rapida presa di decisione in merito al trattamento riabilitativo del paziente
7. **In quali casi l'infermiere utilizza lo score AVPU:**
 - a. Per identificare il rischio anestesiológico
 - b. Per identificare il rischio di allettamento
 - c. Per valutare rapidamente lo stato di coscienza
 - d. Per valutare il caso di insonnia parossistica
8. **Quale paziente ha priorità rispetto agli altri nei seguenti casi clinici:**
 - a. Un paziente che ha necessità della sostituzione delle medicazione
 - b. Un paziente che ha necessità di aspirazione tracheobronchiale
 - c. Un paziente che ha necessità della somministrazione di farmaci per il dolore al sito chirurgico
 - d. Un paziente incontinente che necessita delle cure igieniche
9. **Quale dei seguenti è il farmaco di scelta per la prevenzione della fibrillazione ventricolare in caso di infarto acuto del miocardio:**
 - a. Lidocaina
 - b. Digossina
 - c. Chinidina
 - d. Flecainide
10. **La rilevazione della temperatura corporea orale deve durare almeno:**
 - a. 5 minuti se il paziente non ha avuto febbre in precedenza, 8 minuti se febbrile
 - b. Almeno 10 minuti
 - c. Mediamente 8 minuti
 - d. 3-4 minuti con termometro digitale
11. **In caso di assenza di peristalsi nel periodo post-operatorio è opportuno:**
 - a. Evitare l'assunzione di liquidi sia per OS che endovena
 - b. Evitare che il paziente assuma cibi e bevande
 - c. Incoraggiare l'assunzione di cibi semi-solidi per favorire la ripresa della peristalsi
 - d. Incoraggiare l'assunzione di cibi liquidi-cremosi per favorire la ripresa della peristalsi
12. **Qual è il materiale indicato per effettuare un prelievo venoso brachiale?**
 - a. Laccio emostatico, guanti in lattice sterili, vacutainer, alcol 90%
 - b. Laccio emostatico, guanti in lattice non sterili, vacutainer, clorexidina
 - c. Laccio emostatico, guanti in lattice non sterili, vacutainer, acqua ossigenata
 - d. Laccio emostatico, guanti in lattice sterili, vacutainer, iodopovidone al 10%
13. **Nel processo di sterilizzazione durante la fase di confezionamento bisogna accertarsi che le dimensioni della busta scelta siano tali che il materiale contenuto da sterilizzare:**
 - a. non occupi più di 1/4 del volume totale
 - b. non occupi più di 3/4 del volume totale
 - c. non occupi più di 3/5 del volume totale
 - d. non occupi più di 1/2 del volume totale
14. **Quale tra i seguenti fattori non condiziona l'attività dei disinfettanti?**
 - a. Temperatura ambientale incostante
 - b. Quantità della contaminazione microbica
 - c. Presenza di materiale organico sulla superficie da trattare
 - d. Corretta diluizione

15. L'Emocoltura deve essere eseguita:
- Dopo l'avvio della terapia antimicrobica
 - All'inizio del rialzo febbrile
 - All'inizio della defervescenza
 - In corrispondenza dei brividi febbrili
16. Come si richiedono e come devono essere custoditi i farmaci stupefacenti e le sostanze psicotrope in reparto: alcune affermazioni sono vere, altre false. Identifica la sequenza corretta delle affermazioni:
- 1) La richiesta per la fornitura dei farmaci stupefacenti e psicotropi da parte dell'Unità Operativa avviene tramite un "Modulario per l'approvvigionamento dei Reparti delle Aziende Ospedaliere o dei Presidi Ospedalieri o degli Ospedali presso la Farmacia Interna di medicinali a base di stupefacenti e sostanze psicotrope"
 - 2) Se il reparto è momentaneamente sprovvisto di un medicinale stupefacente è possibile farselo prestare da un altro reparto
 - 3) Il modulario è costituito da 50 fogli-moduli suddivisi in tre sezioni delle quali una rimane al reparto richiedente e le altre 2 sono conservate dal Farmacista e dal Direttore Sanitario
 - 4) I farmaci stupefacenti e psicotropi devono essere conservati in un armadio o un contenitore non asportabile chiuso a chiave, separati da qualunque altro prodotto farmaceutico.
 - 5) La giacenza fisica del farmaco, ovvero l'effettiva quantità presente in reparto, deve corrispondere alla giacenza teorica, cioè alla giacenza riportata sul registro di carico-scarico
 - 6) La movimentazione, sia in entrata che in uscita, deve essere effettuata in rigoroso ordine cronologico I farmaci devono essere accessibili 24 ore su 24 da chi li utilizza
 - 7) Ogni operazione deve essere registrata entro le 36 ore successive alla movimentazione, senza lacune di trascrizione. Deve essere utilizzata un lapis in modo da poter correggere eventuali errori di trascrizione che devono essere annotati e controfirmati da un altro infermiere in servizio
 - 1V- 2F- 3F- 4V- 5V- 6V- 7F
 - 1F- 2V- 3V- 4F- 5F- 6V- 7V
 - 1V- 2V- 3V- 4F- 5V- 6F- 7F
 - 1F- 2 F- 3F- 4V- 5F- 6V- 7V
17. Nella rilevazione della temperatura rettale il termometro deve essere inserito:
- Nell'orifizio anale per 1 cm nel neonato e 4 cm nell'adulto
 - Nel retto per 3 cm nel neonato e 5-6 cm nell'adulto
 - Nell'orifizio anale per la lunghezza del bulbo nell'adulto e nel neonato
 - Nell'ampolla rettale spingendo il termometro per circa 1 cm
18. In un paziente in trattamento farmacologico con Digitale, quali segni e sintomi devono essere considerati come segnali di intossicazione:
- Tachicardia, aritmia cefalea, nistagmo
 - Aritmia dolore epigastrico nausea e vomito neurite ottica
 - Bradycardia, nausea e vomito alterazione della percezione dei colori
 - Dispnea tachicardia nausea e vomito
19. In caso di shock anafilattico cosa si somministra in prima istanza?
- Antistaminico per via intramuscolare o endovenosa
 - Adrenalina per via intramuscolare o endovenosa
 - Farmaci steroidei ad alti dosaggi
 - Farmaci steroidei e anti-istaminici simultaneamente
20. Quale tra le affermazioni elencate, relative all'uso dei guanti non sterili, è da considerare non corretta?
- Occorre tenere indossati i guanti non sterili per il tempo strettamente necessario
 - Occorre cambiare i guanti non sterili con la stessa frequenza con cui si lavano le mani
 - L'uso dei guanti non sterili evita il lavaggio antisettico delle mani
 - Occorre utilizzare i guanti non sterili durante l'esecuzione di un prelievo venoso