

Prova 2

1	<p>Prima di procedere alla rilevazione del polso è opportuno invitare e/o aiutare la persona assistita ad assumere la posizione supina e a posizionare l'avambraccio sul torace o lungo il fianco:</p> <ol style="list-style-type: none"> Con il polso e la mano nella posizione preferita dall'assistito. Con il polso esteso ed il palmo verso l'alto. Con il polso flessa e la mano chiusa. Con il polso esteso ed il palmo verso il basso. 	2,000								
2	<p>I comportamenti adeguati alla prevenzione del rischio biologico sono quelli che riflettono il rispetto delle precauzioni standard. Tra questi è compreso il lavaggio delle mani che deve essere effettuato prima e dopo aver indossato i guanti monouso, utilizzando detergenti liquidi erogati da dispenser. Il tipo di lavaggio indicato è:</p> <ol style="list-style-type: none"> Il lavaggio antisettico. Il lavaggio sociale. Il lavaggio antisettico prolungato. Il lavaggio chirurgico. 	1,500								
3	<p>La fonte normativa che istituisce l'operatore socio-sanitario è:</p> <ol style="list-style-type: none"> D.M. 10 febbraio 1984. Atto del 22 febbraio 2001 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome. L. 42/1999 sulle professioni sanitarie. D.L. 12 novembre 2001, n. 402, convertito con modificazioni in L. 8 gennaio 2002, n. 1. 	1,000								
4	<p>Per antisepsi si intende:</p> <ol style="list-style-type: none"> Un insieme di norme atte a impedire la contaminazione microbica di substrati già sterili. Un insieme di norme atte a impedire o rallentare la moltiplicazione dei germi patogeni e non patogeni. Un processo che permette l'uccisione di ogni organismo vivente (microrganismi patogeni, saprofiti, miceti, spora e virus). La detersione eseguita mediante l'uso di saponi liquidi ad alto potere detergente. 	1,500								
5	<p>Associare ciascuna categoria di indagine che si può condurre su campioni urina alle relative finalità (combinazione lettere-numeri):</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">A) Urinocoltura.</td> <td style="width: 75%;">1) Fornisce informazioni su colore, pH, presenza/assenza di glucosio, presenza/assenza di proteine, presenza/assenza di sostanze derivanti dal metabolismo epatico, peso specifico, presenza/assenza di globuli bianchi, globuli rossi, batteri.</td> </tr> <tr> <td>B) Esame su campione urina delle 24 h.</td> <td>2) Fornisce informazioni sull'eventuale presenza di microrganismi responsabili di infezione delle vie urinarie.</td> </tr> <tr> <td>C) Campione urina standard.</td> <td>3) Consente di ottenere informazioni relativamente a sostanze escrete dal rene.</td> </tr> <tr> <td>D) Gravindex.</td> <td>4) Rileva la presenza, sulle prime urine del mattino, dell'ormone hCG (gonadotropina corionica).</td> </tr> </table> <p> <ol style="list-style-type: none"> A-2; B-1; C-3; D-4. A-4; B-1; C-3; D-2. A-4; B-3; C-1; D-2. A-2; B-3; C-1; D-4. </p>	A) Urinocoltura.	1) Fornisce informazioni su colore, pH, presenza/assenza di glucosio, presenza/assenza di proteine, presenza/assenza di sostanze derivanti dal metabolismo epatico, peso specifico, presenza/assenza di globuli bianchi, globuli rossi, batteri.	B) Esame su campione urina delle 24 h.	2) Fornisce informazioni sull'eventuale presenza di microrganismi responsabili di infezione delle vie urinarie.	C) Campione urina standard.	3) Consente di ottenere informazioni relativamente a sostanze escrete dal rene.	D) Gravindex.	4) Rileva la presenza, sulle prime urine del mattino, dell'ormone hCG (gonadotropina corionica).	1,500
A) Urinocoltura.	1) Fornisce informazioni su colore, pH, presenza/assenza di glucosio, presenza/assenza di proteine, presenza/assenza di sostanze derivanti dal metabolismo epatico, peso specifico, presenza/assenza di globuli bianchi, globuli rossi, batteri.									
B) Esame su campione urina delle 24 h.	2) Fornisce informazioni sull'eventuale presenza di microrganismi responsabili di infezione delle vie urinarie.									
C) Campione urina standard.	3) Consente di ottenere informazioni relativamente a sostanze escrete dal rene.									
D) Gravindex.	4) Rileva la presenza, sulle prime urine del mattino, dell'ormone hCG (gonadotropina corionica).									
6	<p>Quale fra le seguenti non rientra fra le misure preventive per evitare la formazione delle piaghe da decubito:</p> <ol style="list-style-type: none"> Stimolare la circolazione. Decomprimere cambiando frequentemente la posizione dell'assistito. Massaggiare sulle prominente ossee. Abbigliare il paziente con indumenti in fibre naturali. 	1,500								
7	<p>Indicare in quale alimento, tra quelli elencati, NON è contenuta la vitamina D:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peperoni. Tuorlo d'uovo. Burro. Formaggio. 	1,500								
8	<p>Cosa si intende per riabilitazione?</p> <ol style="list-style-type: none"> Si può definire riabilitazione l'intervento specifico da attuare nei confronti delle barriere architettoniche. Tale intervento ha come obiettivo l'educazione o la rieducazione delle funzioni fisiche e/o mentali generate da uno stato di invalidità fisica, psichica o sensoriale. Si può definire riabilitazione l'intervento specifico da attuare nei confronti delle patologie di cui è affetto il paziente. Si può definire riabilitazione l'intervento specifico da attuare nei confronti del disabile. Tale intervento è fine a sé stesso. Si può definire riabilitazione l'intervento specifico da attuare nei confronti del disabile. Tale intervento ha come obiettivo l'educazione o la rieducazione delle funzioni fisiche e/o mentali generate da uno stato di invalidità fisica, psichica o sensoriale. 	1,500								
9	<p>La raccolta dei campioni feci per coprocoltura richiede:</p> <ol style="list-style-type: none"> L'uso di contenitori non sterili. 	0,500								

