

**PROVA PRATICA N. 3: CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI  
N. 2 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE INFERMIERE – CAT. D (76/2019/CON)**

1. **Metti in ordine le seguenti procedure utilizzate per applicare una medicazione:**
  - A. applicare la medicazione pulita sulla ferita e fissarla alla cute
  - B. togliere la vecchia medicazione tirando il cerotto in direzione della ferita e rimuovere la medicazione vecchia
  - C. controllare l'essudato o le secrezioni quindi eliminare la medicazione vecchia nei rifiuti biologici
  - D. lavare le mani ed indossare i guanti
  - E. con tamponi imbevuti di disinfettante o fisiologica (secondo procedure interne) pulite i margini della ferita e controllare la cute
  - F. rimuovere i guanti, lavarsi le mani, aiutare il paziente ad assumere una posizione confortevole
    - a. B-E-A-D-E-C
    - b. D-B-C-E-A-F
    - c. D-C-F-A-E-B
    - d. A-B-C-D-E-F
2. **Metti in ordine le seguenti procedure utilizzate per la raccolta di un campione culturale da essudato di ferita:**
  - A. Indossare i guanti sterili e aprire la provetta sterile
  - B. Controllare la ferita e dopo aver rimosso i guanti aprire la confezione contenente le provette sterili
  - C. Reinserire il tampone nella provetta facendo attenzione a non contaminare la parte esterna con l'essudato, etichettare la provetta e provvedere alla consegna al laboratorio
  - D. Inserire la punta del tampone nella ferita ruotando delicatamente per imbeverare il tampone del secreto, senza toccare con il tampone la cute intatta
  - E. Provvedere alla risistemazione della medicazione e del paziente
  - F. Indossare i guanti monouso e rimuovere la medicazione
    - a. FBADCE
    - b. EDBFAC
    - c. ECFDAB
    - d. BFDECA
3. **Un infermiere si trova ad ispezionare le mani di un paziente con ustioni di II grado. Quale alterazione caratteristica può riscontrare:**
  - a. Flittene
  - b. Infezione virale
  - c. Escara molle
  - d. Diminuzione di tessuto necrotico
4. **Un paziente con disfagia presenta:**
  - a. Avversione per i cibi solidi
  - b. Dolore post prandiale
  - c. Difficoltà nella deglutizione
  - d. Difficoltà nell'assumere liquidi
5. **L'emorragia rettale è definita come:**
  - a. Papilloma
  - b. Melena
  - c. Proctorragia
  - d. Ematemesi
6. **La sintomatologia dell'epilessia è caratterizzata da:**
  - a. Lenta insorgenza di deficit neurologici irreversibili
  - b. Accessi parossistici ricorrenti
  - c. Perdita di coscienza
  - d. Ritardo mentale
7. **Un paziente ha ritenzione urinaria ovvero:**
  - a. Ha bruciore durante la minzione
  - b. Produce urina inferiore a 400 ml nelle 24 ore
  - c. Produzione urina maggiore di 700 ml nelle 24 ore
  - d. Ha mancata emissione all'esterno di urina presente in vescica
8. **Il trattamento delle anemie:**
  - a. Prevede sempre la somministrazione di ferro per via venosa
  - b. Dipende dalla causa che l'ha scatenata
  - c. Prevede sempre la somministrazione di ferro e dieta ricca di proteine
  - d. Richiede sempre la somministrazione di concentrati di globuli rossi
9. **Quando è opportuno eseguire i tamponi vaginale e/o cervicale:**
  - a. In gravidanza quando c'è sospetto di infezione
  - b. In gravidanza per controllare alcune alterazioni genetiche
  - c. In gravidanza per identificare e debellare potenziali virus patogeni per il feto
  - d. Tutte le precedenti
10. **In Italia l'insulina si inietta con siringhe:**
  - a. Da 40 U.I. per ml
  - b. Da 100 U.I. per ml
  - c. Da 40 U.I. o 100 U.I. facendo le debite conversioni
  - d. Scelta in relazione al flacone di insulina
11. **Nel quadro dello shock settico non si riscontra:**
  - a. Ipotensione
  - b. Bradicardia
  - c. Brivido che precede la ipotensione
  - d. Cute calda ed asciutta
12. **Nel delirium del paziente anziano vi è compromissione:**
  - a. Solo dell'attenzione
  - b. Di tutte le funzioni cognitive
  - c. Solo della memoria
  - d. Solo dell'orientamento temporo-spaziale
13. **L'accentuazione del dolore in seguito al rilascio immediato della pressione delle dita della mano durante la palpazione dell'addome indica la positività del segno di:**
  - a. Allen
  - b. Aazon
  - c. Blumberg
  - d. Murphy
14. **Si parla di malattia da ustione quando la parte ustionata supera il:**
  - a. 50% nell'adulto e 30% nel bambino
  - b. 20% nell'adulto e 10-12% nel bambino
  - c. Ogni volta che sia presente un'ustione indipendentemente da grado
  - d. 50% nel bambino e 60% nell'adulto
15. **Prima della somministrazione di nutrizione enterale in bolo mediante sondino nasogastrico occorre sempre:**
  - a. Tutte le altre risposte sono corrette
  - b. Far assumere al paziente la posizione supina
  - c. Misurare la glicemia capillare e pesare il paziente
  - d. Valutare il contenuto gastrico residuo

16. **Identifica la sequenza corretta di azioni per eseguire un tampone faringeo:**
- 1) invita il paziente ad inclinare la testa all'indietro e ad aprire bene la bocca
  - 2) estrae il tampone dalla custodia
  - 3) effettua l'igiene delle mani; indossa guanti monouso e mascherina
  - 4) inserisce il tampone nel terreno di trasporto;
  - 5) etichetta il tampone e lo inserisce nell'apposito sacchetto di trasporto
  - 6) inserisce il tampone dietro l'ugola e tra i pilastri tonsillari, evitando il contatto con altre zone dell'interno della bocca evitando contaminazioni con la saliva
- a. 3 1 2 6 4 5
  - b. 1 2 3 4 6 5
  - c. 2 1 3 6 5 4
  - d. 1 2 3 6 5 4
17. **In un paziente sottoposto a insulino terapia è importante:**
- a. La rotazione delle sedi di iniezione
  - b. Massaggiare con cura dopo ogni iniezione
  - c. Riscaldare l'insulina prima dell'iniezione
  - d. Cambiare tipo di insulina in modo ciclico
18. **Quale è la corretta definizione di cure palliative?**
- a. L'insieme degli interventi che facilitano la morte del paziente
  - b. L'insieme degli interventi terapeutici ed assistenziali finalizzati alla cura attiva e totale di quei pazienti la cui malattia non risponde più a trattamenti specifici
  - c. L'insieme degli interventi terapeutici ed assistenziali finalizzati alla riduzione del dolore in quei pazienti la cui malattia ha un'evoluzione rapida e prognosi infausta
  - d. L'insieme degli interventi di supporto psicologico rivolti ai pazienti affetti da malattie inguaribili ed allo stadio terminale
19. **In caso di prelievo per emocoltura, l'antisepsi della cute del paziente deve essere effettuata con:**
- a. Iodopovidone al 10 % in soluzione alcolica al 70 % o clorexidina al 2% in soluzione alcolica al 70%.
  - b. Soluzioni antisettiche a base di clorossidante elettrolitico 0,05-0,1%
  - c. Perossido d'idrogeno al 6%
  - d. Derivati fenolici o benzalconio cloruro
20. **La movimentazione manuale di un carico può costituire rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico in tutti i casi sottoindicati, tranne uno:**
- a. Il carico è ingombrante o difficile da afferrare
  - b. Il carico è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi
  - c. Il carico richiede di tenerlo o maneggiarlo a una certa distanza con una torsione o inclinazione del tronco
  - d. Il carico è collocato in basso o sul pavimento e non pesa più di 23 Kg