

**PROVA PRATICA N. 3: CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI
N. 2 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE INFERMIERE – CAT. D (76/2019/CON)**

1. **Quale sequenza è corretta nella preparazione di un paziente al quale dovrà essere introdotto un catetere vescicale?**
 - A. Posizionare il paziente
 - B. Lavaggio delle mani ed osservare le procedure per la prevenzione delle infezioni
 - C. Verificare identità del paziente
 - D. Presentarsi e spiegare la procedura
 - E. Provvedere alla privacy del paziente
 - a. C-D-B-E-A
 - b. D-B-E-A-C
 - c. C-A-E-D-B
 - d. B-A-E-C-D
2. **Metti in ordine le seguenti procedure utilizzate per applicare una medicazione umida:**
 - A. assicurandosi di registrare in cartella la procedura e le osservazioni sulla cute
 - B. preparare l'area di lavoro pulita e sgombra
 - C. posizionare una medicazione pulita sulla ferita e fissarla alla cute
 - D. collocare il telo assorbente sotto il paziente ed indossare i guanti rimuovendo la vecchia medicazione, smaltirla tra i rifiuti biologici
 - E. indossare i guanti sterili e pulire la ferita con soluzione fisiologica irrigando a bassa pressione con aiuto di una siringa dalla zona meno contaminata alla zona più contaminata
 - F. far assumere al paziente una posizione comoda così che la ferita sia accessibile e che la soluzione di irrigazione fluisca dalla parte pulita a quella sporca
 - a. A B C D E F
 - b. E D B F A C
 - c. E C F D A B
 - d. B F D E C A
3. **Il rischio chimico è dovuto all'esposizione del lavoratore agli agenti chimici pericolosi, quelli maggiormente presenti in ospedale sono:**
 - a. Farmaci antiblastici e radiazioni ionizzanti
 - b. Gas anestetici e radiazioni ionizzanti
 - c. Gas anestetici e criogenetici, farmaci antiblastici, sterilizzanti e disinfettanti
 - d. Sterilizzanti e disinfettanti
4. **Nella osservazione infermieristica di un paziente affetto da morbo di Parkinson o Parkinsonismo arteriosclerotico si rileva:**
 - a. Rigidità, tremore, agitazione
 - b. Rigidità, tremore, acinesia
 - c. Acinesia, tremore, atrofia
 - d. Acinesia, rigidità, aprassia
5. **Nei primi 15 minuti dalla somministrazione di un emotrasfusione la velocità di infusione deve essere pari a:**
 - a. 50 gg/min
 - b. 25-30gg/min
 - c. 10-20 gg/min
 - d. Inferiore a 10 gg/min
6. **Nella preparazione di un campo sterile il materiale sterile da aggiungere per l'effettuazione della procedura assistenziale deve essere:**
 - a. Posizionato a margini del campo sterile
 - b. Fatto cadere al centro del campo sterile
 - c. Deve essere posizionato più vicino possibile al chirurgo o dell'operatore responsabile della procedura
 - d. Deve essere posizionato sul campo sterile con la confezione esterna ben chiusa
7. **La somministrazione di più vaccini in una sola somministrazione è:**
 - a. È consigliata al fine di ridurre gli appuntamenti vaccinali e lo stress per bambini e genitori
 - b. È sconsigliata perché si potrebbero verificare fenomeni di incompatibilità
 - c. È sconsigliata perché potrebbe indurre una reazione immunitaria eccessiva
 - d. È consigliata perché fa risparmiare tempo agli operatori sanitari
8. **La biancheria proveniente dai letti in isolamento deve essere confezionata:**
 - a. In appositi sacchi di plastica
 - b. In appositi sacchi di cotone
 - c. In appositi sacchi idrosolubili
 - d. In appositi sacchi in tela di cotone
9. **In quale degli eventi patologici il paziente deve essere posto in posizione laterale di sicurezza:**
 - a. Infarto miocardico acuto
 - b. Perdita di coscienza
 - c. Paziente gravemente ipoteso
 - d. Frattura della colonna vertebrale
10. **Quale tra le seguenti metodiche è utile per prevenire le complicanze legate allo stravasamento di farmaci chemioterapici per via endovenosa periferica:**
 - a. Utilizzare vene in prossimità di articolazioni perché più resistenti
 - b. Utilizzare cannule venose di piccolo calibro (20-23G)
 - c. Applicare fonti fredde lungo il decorso della vena a monte della sede di infusione
 - d. Applicare fonti calde lungo il decorso della vena a monte della sede di infusione
11. **Attribuire il corretto ordine cronologico alle seguenti operazioni concernenti la procedura di esecuzione di una venipuntura per prelievo di sangue:**
 - A. Scegliere il braccio e posizionarlo in modo che risulti esteso in linea retta, utilizzando un ausilio (cuscino) se necessario
 - B. Preparare il materiale
 - C. Applicare il laccio emostatico, 7/10 cm sopra il punto di inserzione dell'ago
 - D. Lavarsi le mani
 - E. Invitare il paziente a chiudere ed aprire il pugno
 - F. Indossare i guanti
 - G. Sistemare il letto ad una altezza idonea per il lavoro
 - a. D B G A F C E
 - b. B C G A D E F
 - c. C F E G B A D
 - d. D E C B A F G

12. **Franco ha avuto un ictus, ha bisogno di aiuto per l'igiene personale e l'alimentazione. Non è sempre lucido. È costretto su sedia a rotelle, e si alza solo se aiutato. È incontinente per le urine più di due volte al giorno ma non sempre, e una o due volte per le feci, ma non sempre. Franco è obeso e diabetico. Franco può essere considerato un paziente a rischio di insorgenza di lesioni da decubito?**
- Nessun Rischio
 - Rischio Lieve
 - Molto a Rischio
 - Rischio Grave
13. **Le infezioni urinarie sono responsabili dell'aumento del costo indiretto del trattamento sanitario perché?**
- Aumentano le giornate di degenza
 - Richiedono cateterizzazioni frequenti
 - Non sono previste nei LEA
 - Causano molte richieste di risarcimento da parte dell'assistito
14. **Perché la temperatura orale sia precisa ed attendibile occorre:**
- Rilevarla sotto la lingua e dopo 30 minuti dall'aver mangiato o fumato
 - Rilevarla all'interno del cavo orale all'altezza dell'ugola
 - Rilevarla se c'è abbondante salivazione
 - Rilevarla ponendo il termometro tra arcata dentale guancia
15. **L'infermiere che deve effettuare la prima alzata del malato dopo prolungato riposo a letto per la prima volta, non deve:**
- Rilevare anticipatamente il polso e la pressione cardiaca
 - Promuovere direttamente la stazione retta per evitare che il paziente si spaventi
 - Valutare il livello di collaborazione
 - Raggiungere la posizione seduta in modo lento e progressivo
16. **In assenza di diverse indicazioni la medicazione semipermeabile trasparente di un catetere venoso centrale deve essere rinnovata:**
- A giorni alterni
 - Ogni tre giorni
 - Ogni 7 giorni
 - Ogni 10 giorni
17. **Quando l'organismo presenta un deficit di ferro, che è un elemento essenziale per la costituzione dell'emoglobina, siamo in presenza di:**
- Anemia perniziosa
 - Anemia sideropenica
 - Anemia aplastica
 - anemia falciforme
18. **Alcuni tipi di farmaci non possono essere frantumati per facilitarne l'assunzione, quali:**
- Farmaci ad assorbimento rapido
 - Farmaci a rilascio lento
 - Farmaci ad azione rapida
 - Farmaci in formulazioni galenica
19. **Nella somministrazione intradermica dei farmaci:**
- la siringa deve essere inclinata da 5 a 15 gradi rispetto al sito di introduzione e l'ago penetrare per circa 3 mm
 - la siringa deve essere inclinata da 15 a 25 gradi rispetto al sito di introduzione e l'ago penetrare per circa 5 mm
 - la siringa deve essere inclinata da 30 a 45 gradi rispetto al sito di introduzione e l'ago penetrare per circa 3 mm
 - la siringa deve essere inclinata da 45 a 60 gradi rispetto al sito di introduzione e l'ago penetrare per circa 5 mm
20. **Le unità di misura del catetere venoso centrale sono:**
- French per il diametro esterno e gauge per il diametro interno, cm per la lunghezza
 - Gauge per il diametro esterno Newton per il diametro interno, cm per la lunghezza
 - Gauge per il diametro esterno, Pascal per il diametro interno cm per la lunghezza
 - Newton per il diametro esterno e gauge per il diametro interno, cm per la lunghezza